

COVID-19 (CORONAVIRUS)

Consignes à suivre pour les enfants atteints de la COVID-19 ou en attente du résultat d'un test pour la COVID-19

Si vous êtes en attente du résultat du test de votre enfant pour la COVID-19 (cas suspecté): le résultat vous sera communiqué dans les prochains jours, qu'il soit positif ou négatif.

Isolement et consignes d'hygiène

Si vous êtes en attente du résultat du test de votre enfant pour la COVID-19 : veuillez s'il vous plaît rester en isolement à la maison et suivre les consignes énoncées dans le document suivant du ministère de la Santé et des Services sociaux: chusj.org/resultatcovid19

Si votre enfant est un cas confirmé de la COVID-19: veuillez s'il vous plaît rester en isolement à la maison et suivre les consignes énoncées dans le document suivant du ministère de la Santé et des Services sociaux: chusj.org/caspositif

La santé publique vous contactera pour vous informer des critères nécessaires pour cesser l'isolement.

Comment vous procurer les médicaments de votre enfant?

Si le médecin a fait une prescription à votre enfant:

- La prescription a été faxée à votre pharmacie.
- Il ne faut **PAS** vous présenter à votre pharmacie.
- Vous devez appeler votre pharmacie et convenir avec le pharmacien de la procédure à suivre pour obtenir les médicaments de votre enfant.

Consignes générales

- Assurez-vous que votre enfant est bien hydraté. Si nécessaire, favorisez des petits boires fréquents.
- Poursuivez la médication usuelle de votre enfant.
- Poursuivez l'hygiène nasale (ex. sinus rinse) régulièrement, au besoin.
- Si votre enfant présente de la fièvre, nous recommandons l'utilisation de l'**acétaminophène** (ex, Tylenol^{MC}, Atasol^{MC}, Tempra^{MC}, marques maison de chaînes et de bannières) comme **premier choix** pour faire baisser cette dernière, en respectant les doses recommandées en fonction du poids et les contre-indications.
- Si votre enfant est âgé de 6 mois ou plus et sa fièvre persiste après quelques doses d'acétaminophène données aux 4 à 6 heures régulièrement, l'**ibuprofène** (ex, Advil^{MC}, Motrin^{MC}, marques maison de chaînes et de bannières) peut être utilisé comme **deuxième choix**, en plus de l'acétaminophène, à raison d'une à deux doses à la fois, en respectant les doses recommandées et les contre-indications *.

*Selon la Société canadienne de pédiatrie, malgré qu'il y ait possiblement des raisons de faire preuve de prudence lors du traitement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (ex: ibuprofène) chez les personnes âgées, rien n'indique que l'ibuprofène utilisée en cas de fièvre ou de douleur soit nuisible aux enfants de plus de six mois atteints d'une COVID-19 suspectée. Pour sa part, Santé Canada recommande d'utiliser l'acétaminophène ou l'ibuprofène pour soulager les symptômes de fièvre chez les patients atteints d'une COVID-19 suspectée.

Si votre enfant présente l'un des symptômes suivants:

- Difficulté à respirer (respiration rapide, tirage important)
- Difficulté à boire ou diarrhées importantes avec signes de déshydratation (bouche sèche, moins de 4 mictions par 24h, yeux cernés, absence de larmes)
- Somnolence
- Persistance de fièvre 3 jours après la consultation initiale

Consultez à l'urgence et précisez que votre enfant est atteint de la COVID-19 ou en attente du résultat d'un test pour la COVID-19.

Ligne d'information du gouvernement du Québec destinée à la population sur la COVID-19, du lundi au vendredi, de 8h à 18h: **1 877 644-4545**