

SUSPICION D'ARTHRITE SEPTIQUE
(Douleur articulaire et **FIÈVRE DOCUMENTÉE**)

avec

ÉPANCHEMENT
ARTICULAIRE

Coordonner si possible avec ponction selon ressources disponibles ou si suspicion élevée

ÉCHOGRAPHIE au besoin pour confirmer

si

PEU OU PAS DE LIQUIDE
(Arthrite septique **PEU PROBABLE**)

donc

CONSIDÉRER:

- IRM si suspicion d'OM à proximité
- Cellulite / Pyomyosite
- Bursite infectée

TOUJOURS FAIRE RX SIMPLE
POUR RECHERCHER:

- Fracture
- Épanchement
- Zone lytique
- Réaction périostée

TOUJOURS ÉVALUER

LABORATOIRES

- FSC
- CRP / VS
- HÉMOCULTURE

EXAMEN CLINIQUE

- Amplitude articulaire
- Capacité de MEC

SUSPECT SI:

- GB >12,000
- CRP >20
- VS >40

SUSPICION FAIBLE

- Amplitude articulaire **PRÉSERVÉE**
- MEC préservée
- Laboratoires **RASSURANTS**
- **ABSENCE** de fièvre documentée

TRAITEMENT ET PLAN:

- AINS
- Ré-évaluation 48-72h PRN

ATTENTION
LYME

- **OBSERVATION** à domicile
- Suivi MD externe
- Unité de Médecine de Jour

DÉTÉRIORATION
CLINIQUE?

SUSPICION INTERMÉDIAIRE

- Refus de MEC
- Restriction amplitude articulaire **SIGNIFICATIVE**
- Laboratoires **RASSURANTS**
- +/- fièvre

OU

- Amplitude articulaire **PRÉSERVÉE**
- MEC préservée
- Laboratoires **SUSPECTS**
- +/- fièvre

Hospitalisation
en **PÉDIATRIE**

Au besoin,
DISCUSSION avec
orthopédiste de garde

DÉTERMINER si:

- Ponction en **ANGIO SEMI-URGENTE**
(peut attendre au lendemain)
- Ponction en **ANGIO URGENTE**
(SOP ORTHO la nuit si résultat +)

Analyses sur liquide

- Décompte GB
- PCR bactérien
- GRAM et culture

Si POSITIF

- Décision SOP selon ORTHO

Si NÉGATIF

- Évaluer autres causes

SUSPICION ÉLEVÉE

- Restriction amplitude **SIGNIFICATIVE**
- Refus de MEC
- Laboratoires **SUSPECTS**
- +/- fièvre

- Hospitalisation en **PÉDIATRIE**
- Consultation en **ORTHOPÉDIE**

DISCUSSION ET PLAN ENTRE ÉQUIPE
TRAITANTE ET ORTHO POUR DÉCIDER:

- SOP d'emblée - lavage articulaire
- Ponction **ANGIO**
- IRM (évaluer OM à proximité)

ATTENTION:

- **DISCUSSION** avec Ortho pour débiter ATBx avant ponction sauf si patient avec **INSTABILITÉ HÉMODYNAMIQUE**

- Attention particulière si:
 - Enfant de < 1 an
 - Douleur à la hanche
 - Fièvre documentée