

- La maladie aiguë se manifeste par [l'érythème migrant](#) (lésion cutanée érythémateuse lentement expansive apparaissant généralement au site de la piqûre, qui a un diamètre ≥ 5 cm et qui persiste ≥ 72 heures [jusqu'à 8 semaines]) ([images d'érythème migrant](#)) ou par un syndrome systémique de fièvre, fatigue, myalgies, arthralgies, céphalées et adénopathies approximativement 7 à 14 jours (étendue : 3 à 30 jours) suivant une piqûre de tique infectée.
- En l'absence de traitement, la maladie peut entraîner d'autres manifestations cutanées, musculo-squelettiques, neurologiques ou cardiaques (tableau 1).

TABLEAU 1. Principales manifestations cliniques de la maladie de Lyme selon le stade

Système	Stade localisé précoce (≤ 30 jours)	Stade disséminé précoce (≤ 3 mois)*	Stade disséminé tardif (> 3 mois)*
Peau	Érythème migrant (60-80%)	Multiples lésions d'érythème migrant	
Musculo-squelettique	Myalgies et arthralgies diffuses	Crises transitoires d'arthrite avec épanchements	Crises d'arthrite asymétrique prolongées
Neurologique	Légère rigidité de la nuque	Paralysie faciale, autres neuropathies crâniennes, méningite, radiculopathie	Polyradiculopathie chronique, atteintes discrètes des fonctions mentales
Cardiaque		Bloc auriculo-ventriculaire, péricardite, myocardite	
Autres	Fièvre, fatigue, céphalées, anorexie, adénopathies	Fièvre, céphalées, fatigue, malaises importants, adénopathies	Fatigue, léthargie

* Approximation générale du délai d'apparition des différentes manifestations de la maladie. Source : ASPC 2014

Régions endémiques

- [Certains secteurs de plusieurs provinces canadiennes](#) : sud du Québec, sud, est et nord-ouest de l'Ontario, sud du Nouveau-Brunswick et l'île Grand Manan, certaines localités de la Nouvelle-Écosse, le sud-est et le centre-sud du Manitoba et le sud de la Colombie-Britannique et l'île de Vancouver.
- Au Québec, les régions où les tiques sont établies et infectées par la bactérie sont les suivantes : une grande partie de la Montérégie, le nord et l'ouest de l'Estrie, le sud-ouest de l'Outaouais et le sud-ouest de la Mauricie-et-Centre-du-Québec ([Carte des municipalités à risque au Québec](#), [Carte de la Montérégie](#), [Carte de l'Estrie](#)).