



**②** En cas de *status epilepticus* :  
› **PHÉNOBARBITAL 20 mg/kg IV** en 20 min x 1 dose  
**OU**  
En cas de convulsions récurrentes :  
› **PHÉNOBARBITAL 10 mg/kg/dose IV** en 10 min x 2 doses PRN  
Dose maximale totale : 40 mg/kg (incluant la 1<sup>ère</sup> dose de charge)  
Dosage de phénobarbital ≥ 1 h après la fin de la dernière dose (encadré \*)  
Doses supplémentaires au besoin selon dosage (encadré \*)



**③** **LÉVÉTIRACÉTAM 60 mg/kg IV** en 15 min x 1 dose  
Peut être donné en 5 min en situation urgente



- Toute autre indication selon l'équipe médicale

**INDICATIONS D'UN TRAITEMENT DE MAINTIEN**

- Convulsions symptomatiques nécessitant ≥ 3 anticonvulsivants en traitement aigu
- Récurrence de crises > 48 h
- *Status epilepticus*
- Autres indications, selon l'avis de la neurologie (p. ex. épilepsie à début néonatal, anomalies génétiques, anomalies du SNC)

**TRAITEMENT DE MAINTIEN SUGGÉRÉ, SI INDIQUÉ**

- Lévétiracétam 15 mg/kg/dose PO ou IV BID

**AVANT CONGÉ**

- Prévoir EEG pour évaluer la possibilité de sevrer le traitement de maintien

**\* DOSAGES**  
Dosage de **phénobarbital** visé en *status* :