Tooth	Boys	Girls
Central incisor (CI)		
Maxillary	7.7 ± 1.2	7.46 ± 1.2
Mandibular	6.8 ± 0.92	6.9 ± 0.92
Lateral incisor (LI)		
Maxillary	8.67 ± 1.2	8.54 ± 1.1
Mandibular	7.9 ± 1.02	7.9 ± 1.07
Canine (C)		
Maxillary	11.68 ± 1.2	11.2 ± 1.1
Mandibular	11.4 ± 1.3	10.8 ± 1.3
First premolar (IPM)		
Maxillary	10.78 ± 1.3	10.5 ± 1.3
Mandibular	10.9 ± 1.41	10.6 ± 1.41
Second premolar (IIPM)		
Maxillary	11.5 ± 1.31	11.21 ± 1.19
Mandibular	11.3 ± 1.32	11.5 ± 1.32
First molar (IM)		
Maxillary	5.4 ± 1.18	5.4 ± 1.07
Mandibular	5.14 ± 1.24	5.18 ± 1.24
Second molar (IIM)		
Maxillary	12.64 ± 1.138	12.3 ± 1.02
Mandibular	12.2 ± 1.17	11.9 ± 1.17

* $P \leq 0.05$ is considered as statistically significant



Pathologie à ref <24h

- Avulsion
- Luxation
- Fx Ellis 3
- Fx racine suspectée
- Fx Ellis 2 (<48h)