

# COVID-19 (CORONAVIRUS)

**Consignes à suivre pour les enfants atteints de la COVID-19 ou en attente du résultat d'un test pour la COVID-19**

**Si vous êtes en attente du résultat du test de votre enfant pour la COVID-19 (cas suspecté): le résultat vous sera communiqué dans les prochains jours, qu'il soit positif ou négatif.**

## **Isolement et consignes d'hygiène**

Si vous êtes en attente du résultat du test de votre enfant pour la COVID-19 : veuillez s'il vous plaît rester en isolement à la maison et suivre les consignes énoncées dans le document suivant du ministère de la Santé et des Services sociaux: [chusj.org/resultatcovid19](https://chusj.org/resultatcovid19)

Si votre enfant est un cas confirmé de la COVID-19: veuillez s'il vous plaît rester en isolement à la maison et suivre les consignes énoncées dans le document suivant du ministère de la Santé et des Services sociaux: [chusj.org/caspositif](https://chusj.org/caspositif)

**La santé publique vous contactera pour vous informer des critères nécessaires pour cesser l'isolement.**

## **Comment vous procurer les médicaments de votre enfant?**

Si le médecin a fait une prescription à votre enfant:

- La prescription a été faxée à votre pharmacie.
- Il ne faut **PAS** vous présenter à votre pharmacie.
- Vous devez appeler votre pharmacie et convenir avec le pharmacien de la procédure à suivre pour obtenir les médicaments de votre enfant.

## Consignes générales

- Assurez-vous que votre enfant est bien hydraté. Si nécessaire, favorisez des petits boires fréquents.
- Poursuivez la médication usuelle de votre enfant.
- Poursuivez l'hygiène nasale (ex. sinus rinse) régulièrement, au besoin.
- Pour l'instant, nous recommandons l'utilisation d'acétaminophène (ex. Tylenol<sup>MC</sup>, Atasol<sup>MC</sup>, Tempra<sup>MC</sup>, marques maison des chaînes et bannières) en première intention pour soulager les symptômes de fièvre, en respectant les doses recommandées en fonction du poids. Pour les enfants de plus de 6 mois, l'ibuprofène (ex. Advil<sup>MC</sup>, Motrin<sup>MC</sup>, marques maison des chaînes et bannières) peut être utilisé en deuxième intention pour la fièvre ou pour soulager la douleur, tout en respectant les doses recommandées et les contre-indications.\*

\*Selon la Société canadienne de pédiatrie, malgré qu'il y ait possiblement des raisons de faire preuve de prudence lors du traitement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (ex: ibuprofène) chez les personnes âgées, rien n'indique que l'ibuprofène utilisée en cas de fièvre ou de douleur soit nuisible aux enfants de plus de six mois atteints d'une COVID-19 suspectée. Pour sa part, Santé Canada recommande d'utiliser l'acétaminophène ou l'ibuprofène pour soulager les symptômes de fièvre chez les patients atteints d'une COVID-19 suspectée.

## Si votre enfant présente l'un des symptômes suivants:

- Difficulté à respirer (respiration rapide, tirage important)
- Difficulté à boire ou diarrhées importantes avec signes de déshydratation (bouche sèche, moins de 4 mictions par 24h, yeux cernés, absence de larmes)
- Somnolence
- Persistance de fièvre 3 jours après la consultation initiale

**Consultez à l'urgence et précisez que votre enfant est atteint de la COVID-19 ou en attente du résultat d'un test pour la COVID-19.**

Ligne d'information du gouvernement du Québec destinée à la population sur la COVID-19, du lundi au vendredi, de 8h à 18h: **1 877 644-4545**