

CRITÈRES POUR UNE CONSULTATION AUTOMATIQUE À L'ÉQUIPE DE CHIRURGIE

1. TOUS LES TRAUMAS DE NIVEAU 1


- Arrêt cardiorespiratoire
- Tous signes de choc:
 - Hypotension selon l'âge du patient :
 - <1 an: Pression systolique <60 mmHg
 - 1-10 ans: Pression systolique <(70+2*âge) mmHg
 - >10 ans: <90 mmHg
 - Signes d'hémorragie significative
 - Transfusions en cours
- Tous signes de difficultés respiratoires:
 - Obstruction des voies respiratoires hautes secondaires à trauma
 - Signes d'insuffisance respiratoire (hypoxie, utilisation des muscles accessoires, "grunting")
 - Murmures vésiculaires diminués à l'auscultation
- Trauma crânien sévère (GCS<9)
- Trauma pénétrant à la tête, cou, torse ou extrémités proximales au coude/genou
- Fracture du bassin
- Suspicion de lésion médullaire
- Amputation proximale au poignet/cheville
- Brûlures de >30% de la surface corporelle totale, explosion dans un espace clos

2. TOUS LES TRAUMAS DE NIVEAU 2

- Évidence de trauma abdominal sans compromis hémodynamique
 - Abdomen distendu et/ou douloureux
 - Signe de la ceinture de sécurité/abrasion abdominale
- Trauma crânien modéré (GCS 9-12)
- Fracture d'au moins 1 os long avec mécanisme significatif
- Brûlure de 15-30% de la surface corporelle totale

3. CHUTES > 5 mètres

4. PEM avec critères d'admission en trauma



Marianne Beaudin, MD, MSc, MPH, FRCSC
Chirurgienne pédiatrique
CHU Ste-Justine
MB/snt