

La cellulite préseptale

Votre enfant est traité pour une cellulite préseptale (également appelée cellulite périorbitaire), ce qui veut dire une infection de sa paupière et des tissus mous autour de son œil. Une cellulite préseptale fait souvent suite à un rhume avec une conjonctivite ou à une infection de la peau suite à une petite blessure. Un traitement antibiotique a été débuté et doit se poursuivre 10 à 14 jours minimum, selon votre prescription.

Votre médecin vous recommande les traitements suivants (À COCHER)

Soins à la maison

ANTIBIOTIQUE PAR VOIE ORALE

- Si vous avez reçu une prescription pour un antibiotique à donner par voie orale, il est très important de le débiter le plus tôt possible.
- Par la suite, continuer de donner les doses à des heures régulières, selon la prescription.

HYGIÈNE NASALE

- Si votre enfant a un rhume, assurer vous de faire une hygiène nasale au moins 4 fois par jour avec une solution saline maison ou commerciale (Sinus Rinse^{MD}, NetiRinse^{MD})
- Voir: [https://www.chusj.org/fr/soins-services/O/ORL-\(oto-rhino-laryngologie\)/L-hygiene-nasale](https://www.chusj.org/fr/soins-services/O/ORL-(oto-rhino-laryngologie)/L-hygiene-nasale)
 - < 6 mois: 5 mL/narine 4-6 x/jour
 - ≥ 6 mois, < 2 ans: 10 mL/narine 4-6x/jour
 - ≥ 2 ans: Technique irrigation à la bouteille, 120-240mL pour traiter les 2 narines 3-4x/jour

CORTICOSTÉROÏDES NASAUX selon votre prescription

COMPRESSES TIÈDES 4 fois par jour

TRAITEMENT DE LA DOULEUR OU DE LA FIÈVRE :

- Acétaminophène (Tylenol^{MD}, Tempra^{MD} ou marque du commerce) aux 4 heures au besoin
- Si non réponse à l'acétaminophène et en l'absence de contre-indications, vous pouvez opter pour: Ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD} ou marque du commerce) aux 6 heures au besoin

Suivi au centre de jour: Référez-vous au dépliant remis

Reconsulter précocement si votre enfant :


- Présente une augmentation de l'enflure de sa paupière ou de son œil;
- Se plaint de ne pas bien voir ou de vision double;
- A de la douleur en bougeant son œil ou une douleur importante à sa paupière malgré l'acétaminophène et/ou l'ibuprofène;
- A une détérioration de son état général, a un mal de tête important ou une raideur de son cou

Où se présenter ?

- Entre 8h et 16h : Appeler au centre de jour 514 345 4931 – poste 2380
- Entre 16h et 8h am : Urgence

Cellulite préseptale:
Infection de(s)
paupière(s) et
des tissus
mous autour
de l'œil

Paupière
supérieure



Paupière
inférieure

Urgence, ophtalmo, ORL, pédiatrie
Décembre 2020