

thérapeutiques s'offriront pour votre enfant :

1. Aucun traitement : une surveillance des symptômes durant les prochaines semaines sera nécessaire.
2. Prophylaxie post-exposition : une dose unique d'un antibiotique pourra être administrée sur place si toutes les conditions sont respectées.
3. Traitement de la maladie de Lyme: un traitement antibiotique sur plusieurs semaines sera recommandé.

La décision de traiter ou non les expositions à une tique n'est pas simple : certains antibiotiques ont des restrictions d'utilisations (âge, effets secondaires).

Afin de discuter des risques et bénéfices de la médication en fonction du risque de transmission, le médecin spécialiste en maladies infectieuses pourra également être consulté et un

piqûre de tique :

- Zone rouge de 5 cm et plus,
- Fièvre ou des frissons,
- Maux de tête continus,
- Douleurs musculaires ou articulaires ou un gonflement des articulations,
- Étourdissements, de la confusion ou une paralysie faciale,
- Raideur du cou,
- Palpitations ou essoufflement inexplicable.

Pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone :

Clinique des Maladies Infectieuses
(514) 345-4931 ext.3937

Photo de la tique (*Ixodes Scapularis*)

<http://www.pbases.com/image/50915544>

Photo érythème migrans

Source : CHU Sainte-Justine

Réalisation

M Denis Blais, inf. clinicien, maladies infectieuses

Dr Christian Renaud, pédiatre microbiologiste

LA MALADIE DE LYME



INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARENTS



CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant