

Aeromonas hydrophila/caviae	Seulement si encore symptomatique, grave ou immunocompromis Retour garderie si Asy	1 ^{er} : <i>TMP/SMX</i> PO 10 mg/kg/j de TMP (max 320 mg/j) en BID x 5-10j Alternative: <i>Clavulin</i> PO 50 mg/kg/j (max 2625mg/j, soit 875mg/dose) en TID x5-10j Ou selon antibiogramme
Campylobacter coli/jejuni	Oui, si encore Sy Retour garderie si Asy	<i>Azithromycine</i> PO 10 mg/kg/j (max 500 mg/j) J1, puis 5mg/kg/j (max 250 mg/j) DIE J2-5 (ou <i>Biaxin</i>)
C. difficile (si atb et colite+, immunosuprimé)	Oui, si encore Sy chez ≥ 3 ans (± 1-3 ans) Pas tester si <1 an, éliminer autres causes si 1-3ans Retour garderie si Asy Voir INESSS : GUO <i>C. difficile</i>	<i>Métronidazole</i> PO 30mg/kg/j (max 1.5g/j, soit 500mg/dose) en TID x 10-14j Si allergie ou sévère (fièvre, frissons) : <i>Vancomycine</i> PO 40 mg/kg/j (max 500 mg/j soit 125 mg/dose) en QID x10-14j et discuté MI Si compliqué (choc, iléus, péritonisme) : <i>Vanco</i> PO ci haut ET <i>Métronidazole</i> IV 30mg/kg/j (max 2g/j, soit 500mg/dose) en QID x 10-14j et discuté MI
Shigatoxine + Type 1: + rassurant Type 2: + sévère	Pas antibio Relance téléphonique ± bilans si Sy Si Stx1: retour garderie si 48h ASy Si Stx2: retour garderie si 48h ASy ET 2 PCR-	Revoir à l'urgence si Sy persistants (particulièrement si Stx2, ou si oligurie) Revoir Md Tx/MI si Asy et Stx2 pour suivi PCR
Salmonella sp	Le plus souvent Sy résolus Oui, si ≤ 3 mois, cardiopathie, Sy prolongées, sepsis, immunocompromis, anémie falciforme Retour garderie si Asy	Prolongé: <i>Amoxicilline</i> PO 50 mg/kg/j (max 3 g/j) en TID x 10-15j si sensible <i>TMP/SMX</i> PO 10 mg/kg/j de TMP (max 320 mg/j) en BID x 10-15j ou <i>Azithromycine</i> PO 10 mg/kg (max 500 mg/j) J1, puis 5mg/kg/dose (max 250 mg/j) J2-5 Sepsis: <i>Cefotaxime</i> IV 200 mg/kg/j (max 8g/j), en 4 doses x 7-14j
Salmonella Paratyphi/Typhi	Oui Retour garderie si 3 cultures négatives Retour école si 48h ASy	<i>Ceftriaxone</i> IV 75mg/kg/j (max 2g/j) en 1 dose x 7-14j ou Si non fébrile : peut <i>TMP/SMX</i> , <i>azithromycine</i> , <i>cipro</i> PO
Shigella	Oui Retour garderie si 2 cultures négatives Sauf si S Sonnei (moins sévère, svt asy): Pas Tx si ASy et retour garderie si 48h ASy	Léger: 1 ^{er} : <i>Cefixime</i> PO 8 mg/kg/j (max 400mg/j) en BID x 5j <i>Amoxicilline</i> PO 50mg/kg/j (max 3g/j) en TID x 5-10j si sensible (peut résistance) <i>Azithromycine</i> PO 10mg/kg (max 500 mg/j) J1, puis 5mg/kg/dose (max 250 mg/j) die J2-5 <i>TMP/SMX</i> PO 10 mg/kg/j de TMP (max 320 mg/j) en BID x 5-10j Sévère: <i>Ceftriaxone</i> IV 75 mg/kg/j die (max 2g/j) x 5j
Y. enterocolitica	Oui, si encore Sy. Néé, prolongé, grave	<i>TMP/SMX</i> PO 10 mg/kg/j de TMP (max 320 mg/j) en BID x 10-15j