

Date
Nom de l'enfant
Date de naissance
Numéro de dossier

## Au professionnel de la santé

Cet enfant présente une insuffisance des glandes surrénales. Sa vie dépend de la prise de certains médicaments. Ces médicaments sont :

- Cortef<sup>MD</sup>                       Florinef<sup>MD</sup>                       Suppléments de NaCl

Dans le cas où l'enfant présente une température supérieure à 38,0°C, une infection, un stress, un traumatisme ou une diarrhée sévère, on doit doubler (ou même tripler si la T° est supérieure à 39°C) chaque dose de Cortef<sup>MD</sup> pendant toute la période que dure le stress. Si l'enfant a des nausées et des vomissements empêchant la prise du Cortef<sup>MD</sup> par voie orale, la dose doit être alors administrée par injection, soit :

- Solu-Cortef<sup>MD</sup>, 50mg/m<sup>2</sup>/dose IM ou IV, suivi de 50 mg/m<sup>2</sup> aux 6 heures IM ou IV.

### Lors d'une insuffisance surrénalienne aiguë, administrer :

100 mg/m<sup>2</sup> de Solu-Cortef<sup>MD</sup> IV ou IM, tout en augmentant le volume intravasculaire par une perfusion IV et répéter toutes les 4 heures si nécessaire jusqu'à ce que l'état de l'enfant s'améliore et que ce dernier puisse prendre le Cortef<sup>MD</sup> par la bouche.

Pour plus d'informations, communiquer avec le Service d'endocrinologie du CHU Sainte-Justine au 514 345-4735 du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. Sinon, communiquer avec l'endocrinologue de garde au 514 345-4788.

De plus, lorsque l'enfant se présente à l'urgence, prière de faire signaler l'endocrinologue de garde du CHU Sainte-Justine.

---

#### CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine – Montréal (Québec) H3T 1C5  
Téléphone : 514 345-4931 – [www.chu-sainte-justine.org](http://www.chu-sainte-justine.org)

Révision janvier 2014 par Carole Bélanger, inf. clinicienne/équipe d'endocrinologie.

Graphisme Norman Hogue, communications et affaires publiques

Impression Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine

F-2079 GRM 7786 (rév. 08-2014)