



CARDIO-VASCULAIRE

Teint pâle ou bleutée, faiblesse, étourdissement, enfant peu réactif, perte de conscience.



VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES

Voix rauque ou difficulté à émettre un son, difficulté à avaler sa salive.



INTESTIN

Vomissements répétés ou diarrhée persistante.



ATTEINTE DE 2 SYSTÈMES :



des médicaments additionnels tels un broncho-dilatateur si asthme ou un antihistaminique.

4. Allongez l'enfant au sol et levez-lui les jambes. S'il a de la difficulté à respirer, laissez-le assis. S'il vomit, couchez-le sur le côté.
5. Si les symptômes ne sont pas améliorés ou réapparaissent, d'autres injections d'épinéphrine peuvent être administrées en attendant au moins 5 minutes entre les doses jusqu'à l'amélioration de l'enfant ou l'arrivée des secours.
6. Avisez les parents.
7. Faites transporter l'enfant à l'urgence même si les symptômes sont résolus car ils peuvent réapparaître.

B

En présence de symptôme **D'UNE SEULE** des catégories suivantes:



YEUX / NEZ / BOUCHE

Éternuement, nez qui coule, nez bouché, yeux rouges, yeux qui piquent ou qui coulent, picotement dans la bouche ou la gorge.



1. Administrer un antihistaminique, si prescrit par le médecin.
2. Restez avec l'enfant ; avisez les parents s'ils ne sont pas présents.